

Références : Philippe Voyer, *L'examen clinique de l'aîné*, 2011, Erpi. et *PRN comprendre pour intervenir* 2e édition, OIIQ, 2010

Questions toujours axées sur le malaise dominant		Notez ici les réponse du client
		Si le client ne peut répondre : selon vous, selon les observations du PAB, de la famille
P	<p>Provoquer :Qu'est ce qui provoque, entraîne, aggrave, augmente?</p> <p>Pallier : Qu'est ce qui soulage, améliore, diminue le malaise?</p>	
Q	<p>Qualité :Décrivez-moi votre malaise ? Que ressentez-vous?</p> <p>Quantité :Quelle est l'intensité, échelle 0 à 10 ? Est-ce que votre malaise diminue ou augmente depuis 48h?</p> <p>Quel est l'impact de ce malaise sur vos activités : Comment ce malaise affecte t-il vos AVQ,AVD, est-ce que vous avez dû cesser ou reporter certaines activités depuis que ce malaise a débuté?</p>	<p>Quantité : L'échelle de 0 à 10 est utilisée si le malaise dominant est une douleur, de l'anxiété ou de la dyspnée.</p> <p>*** Impact :</p>
R	<p>Région :Quelle est la région, endroit où se manifeste votre malaise?</p> <p>Irradiation: Votre malaise s'étend-il à d'autres endroits?</p>	<p>R: Seulement si le malaise dominant est une nouvelle douleur ou si l'on peut caractériser une région.</p>
S	<p>Signes et symptômes associés: Avez-vous ressenti d'autres malaises ou des sensations inhabituelles en plus de votre malaise dominant? Avez-vous observé d'autres signes ou changements en plus de votre malaise dominant?</p>	<p>S: Ex.: « Depuis 3 jours, en plus de cette fatigue, avez-vous de nouveaux malaises ? »</p>
T	<p>Temps et intermittence: Depuis quand ce malaise est-il présent? Votre malaise est-il constant ou intermittent ? S'il est intermittent, combien de temps dure t'il, combien de fois par jour se manifeste t'il? À quel moment apparaît-il?</p>	
U	<p>U: Quelle est la cause selon vous ? A quoi associez-vous ce malaise?</p>	<p>U: Ex.: « Votre nouvelle fatigue, présente depuis 3 jours, à quoi est-elle dû selon vous ? »</p>